



EndoColono Contorno - ARAPIARA

Serviço de Colonoscopia e Coloproctologia

Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM-MG 24 432

Título de Especialista em Coloproctologia - Sociedade Brasileira de Coloproctologia



NOME: _____.

Dia da ligadura elástica: ___/___/___; _____. Horário: _____.

Local da ligadura elástica.

ENDO-COLONO CONTORNO / ARAPIARA - Serviço de Colonoscopia.

Av. do Contorno, 3197 - Sala 12. Santa Efigênia. Belo Horizonte. MG. Tel.: (31) 2122 3310 / 3300.

Preparo para a realização da ligadura elástica das hemorroidas.

1. Minilax®-----2 bisnagas.
Aplicar uma bisnaga 2 horas antes da ligadura, esperar 1 hora para aplicar a outra.
Compre na farmácia e veja como se usa na bula.
2. Tomar 1 hora antes da ligadura elástica 2 comprimidos de Buscopam Composto® e 1 comprimido de Melocox®.

Prescrição a ser usada depois da realização da ligadura elástica.


USO ORAL

3. Melocox (Meloxicam)-----15mg-----10 comprimidos.
Tomar 1 comprimido ao dia nos primeiros 5 dias e continue apenas no caso de dor.
4. Buscopan composto-----10 comprimidos.
Tomar 1 a 2 comprimidos até de 6/6 horas no caso a dor.
5. Plantago Ovata (Planta Bem ou Povata)----3,5g---30 envelopes.
Coloque um envelope em 1 copo, acrescente água e tome pela manhã.


USO LOCAL

1. Realizar banhos de assento, em água morna, de manhã, à noite e sempre que sentir dor e/ou desconforto anal, durante 10 a 15 minutos, principalmente nos primeiros 15 dias.

Data:


Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos
CRM-MG 24432

Ligadura Elástica das Hemorróidas



- É o método mais utilizado para o tratamento das hemorróidas internas sintomáticas (sangramento anal, prolapso pelo ânus e dor/desconforto anorretal). É muito simples, seguro e de baixo custo.
- Consta de um aparelho aplicador de anéis de borracha introduzido pelo ânus por dentro do anoscópio previamente introduzido no canal anal. O aplicador está conectado ao aspirador e aspira a hemorróida para o seu interior. Caso o paciente sinta dor o aplicador é reposicionado. Com o aplicador em posição correta o anel elástico é disparado na base da hemorróida estrangulando e cortando a circulação de sangue provocando a sua necrose e posterior queda depois de 5-7 dias.
- Podem ser ligadas 2 a 3 hemorróidas por vez colocando 1 a 3 anéis elásticos em cada (cada anel elástico aplicado corresponde a uma sessão, portanto em cada aplicação realizam-se 2 a 10 sessões). São necessárias 1 a 3 aplicações com intervalo de mínimo 4 semanas, tempo necessário para a cicatrização completa. Permite controlar os sintomas na maioria dos pacientes.
- Você pode comer antes do procedimento.
- Não use antes e depois do procedimento Aspirina, AAS e qualquer anticoagulante.

O que você pode apresentar após o procedimento:

A resposta e tolerância ao procedimento são individuais, enquanto umas pessoas voltam a atividades regulares quase imediatamente outras podem necessitar de 1 a 2 dias de repouso domiciliar.

Reflexo vagal: alguns pacientes, imediatamente após as ligaduras, apresentam tontura com sudorese fria e palidez. Efeito fugaz, melhorando em poucos minutos com o repouso.

Dor anal: tipo aperto, ou mesmo apenas um desconforto (vontade para evacuar), de curta duração (24 a 36 hs), e melhora com uso dos analgésicos prescritos. Dor severa é incomum e precisa ser comunicada por estar associado à infecção.

Sangramento anal: geralmente de pequeno volume e ocorre junto às evacuações. São raros os sangramentos intensos que necessitam de hospitalização e cirurgia para a resolução.

Infecção local: complicação rara e caracterizada pela febre, dor anal intensa, latejante e contínua; geralmente acompanhada da dificuldade para urinar, mas na sua maioria, responde rapidamente ao uso de antibióticos e raramente evolui.

Retorno dos sintomas das hemorróidas: deve-se ao aparecimento de novas hemorróidas, as quais são, na sua maioria, facilmente religadas.