



Dia da Ligadura: ___/___/___; _____. Horário: ___/___

Local onde será realizada a ligadura elástica: **Endo-Colono Especialidades Médicas.**
Av. do Contorno, 3197 – sala 112- Sta Efigênia – Tel.: 31 2122-3300 / 3310 / 3311

Preparo para a realização da ligadura elástica das hemorroidas por endoscopia.

1. Jejum de alimentos de 5 horas e de líquidos de 2 horas.
2. Fleet Enema ou Phosfoenema---130ml---2 unidades.
Aplique uma unidade 2 horas antes da ligadura, espere 1 hora e aplique a outra. Compre na farmácia e veja como se usa na bula.
Veja como se usa na bula. Deite sobre o lado esquerdo, com a perna direita flexionada sobre a esquerda estendida e administre via retal lentamente, permaneça na posição e procure reter o enema por 2 a 4 minutos.
3. Tomar 1 hora antes da ligadura elástica 2 comprimidos de Buscopan Duo e 1 comprimido de Proflan.


Prescrição a ser usada depois da realização da ligadura elástica.

USO ORAL

1. Proflan-----100mg-----12 comprimidos.
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas nos primeiros 3 dias e continue apenas no caso de dor.
2. Buscopan Duo-----10 comprimidos. Tomar 1 a 2 comprimidos até de 6/6 horas no caso a dor.
3. Plantago Ovata (Planta Bem ou Povata)----5g---20 envelopes.
Coloque um envelope em 1 copo, acrescente água e tome pela manhã.


USO LOCAL

1. Realizar banhos de assento, em água morna, de manhã, à noite e sempre que sentir dor e/ou desconforto anal, durante 10 a 15 minutos, principalmente nos primeiros dias.


Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos
CRM-MG 24432



Ligadura Elástica Endoscópica das Hemorroidas



Método novo utilizado para o tratamento das hemorroidas internas sintomáticas (sangramento anal, saída pelo ânus e dor/desconforto anorretal).

É rápida (10 a 15 minutos), simples, bem tolerada, segura, eficaz e com baixas taxas de complicações.

Realizada com sedação consciente reduz o desconforto;

Consta de um aparelho aplicador de anéis de borracha acoplado ao endoscópio flexível introduzido pelo ânus que permite a visão em retroflexão no reto das hemorroidas internas. O endoscópio com o aplicador de anéis elásticos suga a hemorroida para o seu interior permitindo colocar em sua base o anel elástico, cortando a circulação de sangue e provocando a sua necrose e posterior queda depois de 3 a 5 dias.

São usadas de 5 a 7 elásticos nas hemorroidas e permite a cura em 90% dos casos após a primeira aplicação. Quando necessário uma nova aplicação pode ser realizada após 4 semanas, tempo necessário para a cicatrização.

O custo se justifica pelas baixas taxas de complicações, altas taxas de resolução e retorno precoce ao trabalho, geralmente 1 a 2 dias.

Não use antes e depois do procedimento Aspirina, AAS e qualquer anticoagulante.

Maiores detalhes em minha página da internet.

<http://www.derival.com.br/doencas/doencas-do-anus/hemorroidas-ligadura-elastica-por-endoscopia/>

O que você pode apresentar após o procedimento:

A resposta e tolerância ao procedimento são individuais, enquanto umas pessoas voltam a atividades regulares quase imediatamente outras podem necessitar de 1 a 2 dias de repouso domiciliar.

Reflexo vaginal: alguns pacientes, imediatamente após as ligaduras, apresentam tontura com sudorese fria e palidez. Efeito fugaz, melhorando em poucos minutos com o repouso.

Dor anal: tipo aperto, ou mesmo apenas um desconforto (vontade para evacuar), de curta duração (24 a 36 h), e melhora com uso dos analgésicos prescritos. Dor severa é incomum e precisa ser comunicada por estar associado à infecção.

Sangramento anal: geralmente de pequeno volume e ocorre junto às evacuações. São raros os sangramentos intensos que necessitam de hospitalização e cirurgia para a resolução.

Infecção local: complicação rara e caracterizada pela febre, dor anal intensa, latejante e contínua; geralmente acompanhada da dificuldade para urinar, mas na sua maioria, responde rapidamente ao uso de antibióticos e raramente evolui.

Retorno dos sintomas das hemorroidas: deve-se ao aparecimento de novas hemorroidas, as quais são, na sua maioria, facilmente religadas.