



ENDOColONO

Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM-MG 24432

COLOPROCTOLOGIA - COLONOSCOPIA

Título de Especialista em Coloproctologia - Sociedade Brasileira de Coloproctologia

Nome:

USO ORAL

- 1- Celecoxibe ---200 mg-----10 cápsulas.
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas até melhorar.
- 2- Buscopan Composto -----1 caixa.
Tome 1 comprimidos até de 6/6 horas no caso de dor.
- 3- FiberNorm ---1 caixa com 10 Sachês de 5 g.
Adicione 5 g (1 sachê) em 200 ml de água ou, se preferir, em outros líquidos e alimentos quentes ou frios. Mexa até a completa dissolução. Tome uma vez ao dia. Caso o resultado seja bom, passe a comprar a lata.
- 4- Diosmina-900 mg/hesperidina-100 mg-----30 comprimidos.
Tome 1 comprimido de 8/8 horas durante os primeiros 4 dias, baixando para 1 comprimido de 12/12 horas nos 3 dias subsequentes, passando a seguir para a manutenção de 1 comprimido ao dia até melhorar completamente.
- 5- Muvinalax ou Peg-Lax envelope-----2 caixas.
Coloque um envelope em 1 copo, acrescente 200 ml de água e tome uma a duas vezes ao dia. Apenas para os com intestino preso.

USO LOCAL

- 1- Proctyl pomada-----1 tubo.
Aplique, sobre a ferida, a quantidade referente a uma ervilha, massageando um pouco, 3 a 5 vezes ao dia, durante 04 semanas.
- 2- Realize banhos de assento em água morna duas vezes ao dia durante 10 a 15 minutos.

E-mail: derival.santos@gmail.com Site: derival.com.br Facebook: [endocolonocontorno](https://www.facebook.com/endocolonocontorno)

Responsável Técnico: Derival Nelmo Afonso dos Santos. CRM-MG 24432

Av. dos Andradas, 3323/813 (esquina com Av. do Contorno). Santa Tereza.

BH / MG / CEP 31010-560 / Tel. (31) 2510-3311 / WhatsApp (31) 98299-1128

Instagram: [drderivalafonso](https://www.instagram.com/drderivalafonso) Celular: (31) 99217-3218